



図 14 原発性免疫不全症での生存曲線

14. 1-1 分類別




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① SCID	108	72.1%	62.6-79.6%	73	64.8%	54.7-73.1%	51
② WAS	84	90.2%	81.3-95.0%	69	81.2%	70.0-88.5%	39
③ CGD	57	83.9%	71.2-91.3%	45	76.4%	61.8-86.1%	21

14. 1-2 SCIDの移植種類別



対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① Rel-BMT	49	69.2%	54.1-80.1%	32	61.8%	46.2-74.1%	24
② Rel-PB	7	42.9%	9.8-73.4%	3	42.9%	9.8-73.4%	3
③ UR-BM	5	60.0%	12.6-88.2%	3	40.0%	5.2-75.3%	2
④ UR-CB	47	80.9%	66.4-89.5%	35	73.9%	58.6-84.3%	22

14.1-3 WASの移植種類別



対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① Rel-BMT	23	86.4%	63.4-95.4%	19	77.0%	53.3-89.7%	13
② Rel-PB	2	50.0%	0.6-91.0%	1	50.0%	0.6-91.0%	1
③ UR-BM	32	96.8%	79.2-99.5%	28	81.7%	56.7-93.0%	10
④ UR-CB	27	88.9%	69.4-96.3%	21	84.7%	64.0-94.0%	15